

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)
C. C. P. 723-61 - MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

3ème année

N° 44

20 octobre 1955.

Edition générale n° 9

I N F O R M A T I O N S

TRAITEMENT AUTOMNAL DU PECHER

Le coryneum se développe abondamment à l'automne dans certains vergers. Nous conseillons de pulvériser :

- un soufre micronisé
- un soufre dispersé
- de l'oxyquinolène

Attendre un avis ultérieur pour réaliser le traitement cuprique (traitement bleu) qui ne doit être fait qu'après la chute des feuilles pour éviter des brûlures.

MONILIA DE L'ABRICOTIER

Nettoyer immédiatement les arbres en brûlant les organes tués par la maladie (fruits momifiés, rameaux ...).

Cet émondage, à réaliser avant la chute des feuilles, conditionne la bonne réussite des traitements printaniers.

CHENILLES DEFEUILLANTES

Les ravages de ces chenilles (arpen-teuses, compas, etc...) ne peuvent être arrêtés au printemps que par des pulvérisations insecticides onéreuses et souvent difficiles. On peut prévenir ces dégâts en empêchant à l'automne la montée des femelles (dépourvues d'ailes). Ces femelles grimpent le long du tronc à l'automne pour déposer leurs oeufs sur la ramure des arbres (pêcher et abricotier surtout).

Une bande de papier engluée arrête le parasite. Nous insistons auprès des arboriculteurs pour qu'ils recourent à cette pratique très économique.

TEIGNE DU POIREAU

Ce parasite accentue ses dégâts en culture ; il est combattu à l'aide de pulvérisations renouvelées de :

Roténone
Parathion
D.D.T.

P 117

CONSERVATION DES POMES DE TERRE

Afin d'éviter les pertes dues à la pourriture et à la germination des tubercules stockés, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

- 1° - Eliminer les tubercules blessés ou tachés.
- 2° - Rentrer la récolte par temps sec dans un local privé de lumière et dont la température reste au voisinage de + 4°. Ne pas dépasser 60 cm d'épaisseur (ménager des cheminées).
- 3° - Aérer par beau temps, en évitant l'entrée de la lumière qui ferait verdigriser les tubercules.
- 4° - Egermer les tubercules destinés à la consommation.

PARASITES DU CELERI

Actuellement, ce légume est l'objet des attaques de la mouche et de la rouille.

Les larves de la mouche vivent en mineuse dans les feuilles parfois les cotes. Pulvériser (jusqu'à 15 jours de la récolte) une bouillie au parathion.

La rouille provoque des taches qui déprécie les plantes atteintes. Pour la combattre, pulvériser l'un des produits suivants :

- produits cupriques
- Ferbane
- Zinèbe
- Zinèbe cuivre.

AVIS IMPORTANTS

La Station d'Avertissements Agricoles détient encore quelques numéros 69 de la Revue "Phytoma", les abonnés qui ne l'auraient pas reçue sont priés de nous la demander d'urgence.

Prière aux abonnés ayant reçu deux fois le numéro 70 de nous en retourner un exemplaire.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,
L.L. TROUILLON

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, 16 rue de la République, Montpellier. Le Gérant : R. BERTRAND. Autor. du 23/1/53.
Reproduction, adaptation réservées.